

4 timmars miktionsobservation spädbarn

Namn

Personnummer

Datum

Födelsevikt:

Dagens vikt:

Födelselängd:

Kön:

Kl	Blöjvikt (g) Före miktion	Blöjvikt (g) Efter miktion	Mikt volym (g)	Residualurin	Amning/ måltid dryck	Kommentarer

Förekommer läckage vid följande provokationstest?

Situps Ja Nej

Knäböj mot magen Ja Nej

Lätt tryck på urinblåsan Ja Nej

Hur ser urinstrålen ut vid miktion?

Stråle Rinner Droppar



I N S T R U K T I O N

4 timmars miktionsobservation för spädbarn

Så här genomför du 4 timmars miktionsobservation för spädbarn

1. Ta fram blankett för 4 timmars miktionsobservation för spädbarn.
2. Genomför undersökningen tillsammans med förälder/föräldrar.
3. Notera barnets namn, ålder, om, och i så fall när, barnet kissade eller bytte blöja senast.
4. Sätt på en i förväg vägd blöja och fuktindikator*.
5. Vid miktionsläckage blinkar lampan. Notera då tid, vägd urinmängd och resturin mätt med ultraljud. Obs! Avbryt inte barnet utan låt det kissa klart innan åtgärd.
6. Registrera om barnet ammar/äter, sover, bajsar eller är ledset under observationsperioden.
7. Observera barnet avklätt under den sista timmen för att på så sätt kunna studera urinstrålen under miktions. Avsluta med några olika provokationstest för att se om det uppstår läckage. ("situps", knäböj mot magen och lätt tryck över urinblåsan).

* Vid miktionsobservation läggs en fuktindikator i blöjan som indikerar när barnet har kissat.

